

BTS première année, 2019

Dériver les fonctions suivantes.....	4
Résoudre une équation du second degré, discriminant.	4
Algorithme.....	4
Tableau de variations.....	6
Tableau de signe d'un trinôme du second degré.	6
Algorithme de seuil.....	7
Calculer une dérivée.....	7
Donner des limites d'une fonction.....	8
Donner des limites d'une fonction.....	9
Calculer une dérivée.....	9
Calculer une dérivée.....	11
Donner des limites d'une fonction.....	11
Calculer une limite.....	13
Exécution d'un programme en langage PYTHON.....	20
Equation avec la fonction exponentielle.....	21
Dériver des fonctions.....	21
Calculer une dérivée.....	22
Dériver une fonction composée.....	22
Dériver un quotient.....	22
Calculer la limite d'une fraction rationnelle.....	22
Algorithme tiré d'un sujet de BTS (Nouvelle Calédonie 2016).....	18
Dérivée de fonction, équation de la tangente.....	24
Résoudre une équation avec la fonction logarithme népérien.....	24
Dérivée de fonction composée, limite.....	25
Positions relatives de courbes.....	25
Utiliser un développement limité.....	18
Manipulation de formules.....	26
Etude de fonctions.....	27
Développements limités avec Python.....	27
Calculer la limite d'une fraction rationnelle.....	28
Tester une primitive.....	28
Résoudre une équation avec la fonction exponentielle.....	29
Calculer la limite de fonctions.....	29
Simplification avec des puissances.....	30
Logarithmes Népériens, simplifications de formules.....	30
Probabilité et tableaux.....	30

Résoudre une inéquation en utilisant la fonction exponentielle.	31
Calculer des probabilités avec un arbre.	31
Probabilités, écritures.	32
Probabilités conditionnelles.	32
Dériver une fonction inverse.	33
Résoudre une inéquation en utilisant la fonction exponentielle.	33
Etudier une série statistiques à une variable.	34
Calculer une dérivée.	34
Vacances de Noël.....	34
Simplification avec des puissances.	34
Logarithmes Népiériens, simplifications de formules.....	35
Résoudre les équations suivantes :.....	35
Dériver une fonction.	35
Retour de stage.....	36
Résoudre une équation.	36
Calculer une dérivée.	36
Ajustement affine.	36
Résoudre une inéquation avec logarithme.	37
Calculer une intégrale avec la calculatrice.	37
Calculer une intégrale.	37
Primitive et intégrale.....	38
Chercher une primitive.	39
Chercher une primitive.	39
Intégration par parties.	39
Intégration par parties.	40
Vérifier une primitive.	40
Vacances de printemps.....	42
Algorithme de dichotomie.....	42
Le logarithme décimal, intensité sonore.....	42
Calculer une intégrale.	44
Dériver une fonction.	44
Arbre de probabilité et probabilités totales.....	46
Calculer une intégrale.	46
Probabilité conditionnelle.	47
Tester une primitive. Trouver un encadrement à la calculatrice.....	47
Algorithme de seuil.	48
Calculer une valeur moyenne d'une fonction.	48

Etude d'une loi associée à une variable aléatoire.	48
Calculer une intégrale.	49
Calculer une intégrale.	49
Calculer avec une loi binomiale.	50
Intégrale.	50
Loi binomiale, rédaction.....	50
Calculer avec une loi binomiale.	51
Intégrale.	51
Intervalle de fluctuation asymptotique a seuil de 95%.....	51
Comparaison loi binomiale et loi de Poisson.....	53
Intervalle de fluctuation au seuil de 95%	53
Intégrale.	55
Intégrale.	55
Loi binomiale.	56
Loi uniforme	57
Calculer avec une loi exponentielle.	59
Calculer le paramètre de la loi exponentielle.....	59
Calculer avec une loi normale.	59
Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.	60

Dériver les fonctions suivantes.

Dériver les fonctions suivantes :

$$f(x) = 4x - 1$$

$$g(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

$$h(x) = x^3 + 2x^2 + 4x - 5$$

Résoudre une équation du second degré, discriminant.

Résoudre les équations suivantes :

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$4x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 0$$

Solutions :

$$f'(x) = 4$$

$$g'(x) = 6x + 2$$

$$h'(x) = 3x^2 + 4x + 4$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \quad a=1 \quad b=2 \quad \text{et} \quad c=-3 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 4 + 12 = 16 \quad \Delta > 0 \text{ Il y a donc deux solutions réelles}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 + 4}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 - 4}{2} = -3$$

$$4x^2 - 4x + 1 = 0 \quad a=4 \quad b=-4 \quad \text{et} \quad c=1 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 16 - 16 = 0 \quad \Delta = 0 \text{ Il y a donc une solution réelle}$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{4 + \sqrt{16}}{8} = \frac{1}{2}$$

$$2x^2 + 2x + 1 = 0 \quad a=2 \quad b=2 \quad \text{et} \quad c=1 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 4 - 8 = -4 \quad \Delta < 0 \text{ Il n'y a pas de solution réelle}$$

Algorithme.

On considère l'algorithme suivant :

$$x \leftarrow 0$$

$$y \leftarrow -1$$

If $x > y$ alors $x \leftarrow x + y$

Sinon $y \leftarrow x - y$


Quelles sont les valeurs de x et y ? Recommencer avec $x \leftarrow -2$ et $y \leftarrow 1$

Solutions :

x	0	-1
y	-1	-1

x	-2	-2
y	1	-3


Tableau de variations.



Dresser le tableau de variations de la fonction f dessinée à l'aide du logiciel GEOGEBRA.

Tableau de signe d'un trinôme du second degré.

Faire le tableau de signe de la fonction : $f(x) = x^2 - 5x + 4$



Algorithme de seuil.

Une balle part d'une hauteur de 2,5 m et perd 10% de sa hauteur à chaque rebond. On cherche le nombre de rebonds pour qu'elle perde la moitié de sa hauteur. Pour résoudre le problème, on considère l'algorithme suivant :

```

n ← 0
h ← 2,5
Tant que h > 1,25
    n ← n + 1
    h ← h * 0,9
Fin tant que
Afficher n

```

Remplir le tableau d'exécution suivant :

	Initialisation							
n								
h								

Solutions

$$f(x) = x^2 - 5x + 4$$

$$a=1 \quad b=-5 \quad \text{et} \quad c=4$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 16 = 9 \quad \Delta > 0 \text{ Il y a donc deux solutions réelles } x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5+\sqrt{9}}{2} = \frac{5+3}{2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5-\sqrt{9}}{2} = \frac{5-3}{2} = 1$$

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$f(x)$		\circ	\circ	
		+	-	+

	Initialisation							
n	0	1	2	3	4	5	6	7
h	2,5	2,25	2,025	1.8225	1.64	1,48	1,33	1,20

L'algorithme affiche 7

Calculer une dérivée.

Calculer la dérivée de la fonction définie par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$

Donner des limites d'une fonction.

Donner les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 2x + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{3x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x}$$

Vous pouvez représenter les fonctions pour vous aider

Solutions :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 2x + 1 = +\infty \text{ car } 3x^2 \text{ « l'emporte »}$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{3x} = +\infty \text{ car}$$

e^{3x} « l'emporte »

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x} = 0 \text{ car } e^{-x} \text{ « l'emporte » et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

Donner des limites d'une fonction.

Donner les limites de la fonction représentée ci-dessous :



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$


Indiquer les asymptotes éventuelles.

Calculer une dérivée.

Calculer la dérivée de la fonction : $f(x) = x \times e^x$

Rappels : $(e^x)' = e^x$ et $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$

Solutions :



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ (A.H)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ (A.H)} \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \text{ (A.V)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty \text{ (A.V)} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \text{ (A.V)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ (A.V)}$$

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x$$

Calculer une dérivée.

Calculer la dérivée de la fonction définie par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$

Quel est son ensemble définition ?

Donner des limites d'une fonction.

Donner les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 - 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$$

Vous pouvez représenter les fonctions ou faire des calculs avec des nombres bien choisis pour vous aider.

Solutions :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x - 1) - (x + 2) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{x - 1 - x - 2}{(x - 1)^2} = \frac{-3}{(x - 1)^2}$$

Les fonctions f et f' sont définies sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \text{ (A. H } y = 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \text{car la fonction exponentielle l'emporte.}$$

Etude d'une dérivée.

Dériver et dresser le tableau de variation de la fonction

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

Etudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Faire la représentation graphique à la calculatrice.

Solutions :

La fonction est définie sur \mathbb{R} $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$


Etude du signe : $\Delta = 4 - 12 = -8$ $\Delta < 0$ Il n'y a pas de racine. $f'(x)$ est du signe de 3, donc positif.

La fonction f est donc croissante.

Limites : $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 + x^2 + x + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2 + x + 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

Tableau de variations :


x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

Donner l'équation de la tangente en $a = 0$

Rappel pour l'équation de la tangente en a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1x + 1 = x + 1$$



Equation de la tangente :

Soit la fonction définie par $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

Donner l'équation de la tangente en $a = 0$

Rappel pour l'équation de la tangente en a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Donner l'équation de la tangente en $a = 0$ de la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Penser à représenter la fonction et la tangente à l'aide de votre calculatrice.

Solutions.

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1x + 1 = x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

En $a=0$, l'équation de la tangente est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \text{ avec } f'(0) = 0 \text{ et } f(0) = 1 \text{ Donc } y = 0x + 1 = 1$$

$$f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Utiliser un développement limité.

MAXIMA a calculé le DL limité suivant :

```
(%i4) taylor(exp(-x^2), x, 0, 6);
(%o4) /T/ 1 - x^2 + x^4/2 - x^6/6 + ...
```

- 1) De quelle fonction s'agit-il ? A quel ordre ? Au voisinage de quel point ?
- 2) Ecrire correctement le DL à l'ordre 3.
- 3) Quelle est l'équation de la tangente en 0 ?
- 4) Donner la position de la courbe par rapport à la tangente.

Algorithme tiré d'un sujet de BTS (Nouvelle Calédonie 2016)

On considère la fonction $f(x) = x + 2e^{-2.5x}$

4. On considère l'algorithme suivant.

Variable :	k est un entier et A un nombre réel
Initialisation :	A prend la valeur 0
Traitement :	Pour k allant de 0 à 4 A prend la valeur $A + \frac{1}{5} \times f\left(1 + \frac{k}{5}\right)$
	Fin Pour
Affichage	Afficher A

Faire tourner cet algorithme « à la main » en complétant le tableau ci-dessous que l'on recopiera sur la copie (arrondir les valeurs approchées à 10^{-3}).

k		0	1	2	3	4
$\frac{1}{5} \times$ $f\left(1 + \frac{k}{5}\right)$		0,233	0,260			
A	0	0,233				

Solutions.

- 1) Il s'agit de la fonction $f(x) = e^{-x^2}$ au voisinage de 0 à l'ordre 6.
- 2) $f(x) = e^{-x^2} = 1 - x^2 + x^3\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$.
- 3) $y = 1$ est l'équation de la tangente à la courbe en 0.
- 4) La position de la courbe par rapport à la tangente en 0 dépend du signe de $-x^2$.
 $-x^2 < 0$ La courbe est donc au dessous de sa tangente en 0

Solutions :

k		0	1	2	3	4
$\frac{1}{5} \times f(1 + \frac{k}{5})$		0,233	0,260	0,292	0,327	0,364
A	0	0,233	0,493	0,785	1,112	1,476

Calculer une limite.

Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow -3}^> \frac{x+1}{x+3}$

Exécution d'un programme en langage PYTHON

Chercher les valeurs des variables n, a, b, c du programme ci-dessous écrit en langage PYTHON. Utiliser un tableau d'exécution pour suivre les transformations de vos variables.

```
1 n=0
2 a=-1
3 b=-2
4 c=0
5
6 while n<3:
7     if a>0:
8         if b>0:
9             c=a+b
10        else:
11            c=a-b
12    else :
13        a=a+1
14    n=n+1
→ 15 print(n,a,b,c)
```

Solutions :

Pour x proche de -3 par valeurs supérieures, on a $x + 1 = -2$ et $x + 3 = 0^+$

On a donc $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+1}{x+3} = -\infty$ Asymptote verticale $x = -3$

Print output (drag lower right corner to resize)

```
3 1 -2 3
```

Frames

Objects

Global frame

n	3
a	1
b	-2
c	3

Equation avec la fonction exponentielle.

Résoudre l'équation :

$$e^{3x-1} = 4$$

Dériver des fonctions.

Dériver les fonctions suivantes :

$$f(x) = (3x + 1)^2$$

$$g(x) = x \times \cos(x)$$

$$h(x) = \frac{e^x}{x} \text{ pour } x \neq 0$$

$$e^{3x-1} = 4 \Leftrightarrow 3x - 1 = \ln(4) \Leftrightarrow 3x = \ln(4) + 1 \Leftrightarrow x = \frac{\ln(4) + 1}{3}$$

$$f'(x) = 2(3x + 1) \times 3 = 6(3x + 1)$$

$$g'(x) = \cos(x) + x(-\sin(x)) = \cos(x) - x\sin(x)$$

$$h'(x) = \frac{e^x x - e^x}{x^2} \text{ pour } x \neq 0$$

Calculer une dérivée.

Calculer la dérivée de la fonction : $f(x) = x \times \ln(x)$ pour $x > 0$ Penser à utiliser la formule de la dérivée du produit.

Dérivée d'une fonction composée.

Dérivée la fonction $f(x) = x + 2e^{-2.5x}$

Solutions :

$$f'(x) = x \times \frac{1}{x} + \ln(x) = 1 + \ln(x)$$

$$f'(x) = 1 + 2 \times (-2,5)e^{-2.5x} = 1 - 5e^{-2.5x}$$

Dérivée d'un quotient.

Dérivée la fonction : $f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

Calculer la limite d'une fraction rationnelle.

Calculer, indiquer si la fonction possède une asymptote.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{-x^2 + 4}$$

Solutions :

$$f'(x) = \frac{\cos(x) \times \cos(x) - \sin(x) \times (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2}$$

Or $(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2 = 1$ donc $f'(x) = \frac{1}{(\cos(x))^2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{-x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2) = -2$$

Asymptote horizontale en $-\infty$ d'équation $y = -2$

Dérivée de fonction, équation de la tangente.

Dériver la fonction $f(x) = xe^{-x}$.

Donner l'équation de la tangente à la fonction f en $a = 0$.

Rappel pour l'équation de la tangente en a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Résoudre une équation avec la fonction logarithme népérien.

Résoudre l'équation :

$$\ln(4x - 1) = 3$$

Solutions :

$$f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x)$$

$$y = f'(0)(x) + f(0) = 1x + 0 = x$$

Condition d'existence :

$$4x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$$

Résolution :

$$\ln(4x - 1) = 3 \Leftrightarrow 4x - 1 = e^3 \Leftrightarrow x = \frac{e^3 + 1}{4}$$

Vérification :

$$\frac{e^3 + 1}{4} > \frac{1}{4}$$

$$\text{Solution : } S = \left\{ \frac{e^3 + 1}{4} \right\}$$

Dérivée de fonction composée, limite.

Dériver la fonction $f(x) = xe^{2x}$. Donner $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{2x}$. Que peut-on en déduire ?

Positions relatives de courbes

On donne $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$ et $g(x) = -x^2 + x - 1$

Faire un tableau des positions relatives des courbes représentatives de f et de g .

Solutions

$f'(x) = e^{2x} + x \times 2e^{2x} = e^{2x}(1 + 2x)$. La fonction $\exp(x)$ étant positive, la dérivée dépend du signe de $(1 + 2x)$


$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{2x} = +\infty$ car la fonction $\exp(x)$ 'l'emporte' sur les fonctions puissances.

La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$

$$f(x) - g(x) = 2x^2 + 3x - 4 - (-x^2 + x - 1) = 3x^2 + 2x - 3$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 4 \times 3 \times (-3) = 4 + 36 = 40 \quad \Delta > 0 \text{ Il y a donc deux solutions réelles } x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{40}}{6} = \frac{-2 + 2\sqrt{10}}{6} = \frac{-1 + \sqrt{10}}{3} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{40}}{6} = \frac{-2 - 2\sqrt{10}}{6} = \frac{-1 - \sqrt{10}}{3}$$

x	$-\infty$	x_2	x_1	$+\infty$		
$f(x) - g(x)$		+	○	-	○	+
Positions de Cf par rapport à Cg	Cf au dessus de Cg		Cf en dessous de Cg		Cf au dessus de Cg	



Manipulation de formules

$$F = \frac{Gm_a m_b}{d^2} \quad \text{Première Loi de Newton (seconde)}$$

Exprimer m_b en fonction des autres variables. Exprimer d en fonction des autres variables.

$$m_b = \frac{F d^2}{Gm_a} \quad d = \sqrt{\frac{Gm_a m_b}{F}}$$

Etude de fonctions.

Dériver la fonction $f(x) = x^2 e^{-x}$. Faire une étude du signe de la dérivée. Dresser le tableau de variations (Pensez à entrer la fonction dans votre calculatrice). Donner $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$. Que peut-on en déduire ?

Calculer l'équation de la tangente à la courbe en 0

Solutions


$f'(x) = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = e^{-x}(-x^2 + 2x) = xe^{-x}(-x + 2)$ < La fonction $\exp(-x)$ étant positive, la dérivée dépend du signe de $x(x - 2)$ Vous pouvez aussi faire le discriminant de $-x^2 + 2x$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		-	○	+	○	-	
$f(x)$	∞	↘		0	↗		$4e^{-2}$
							0

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ car la fonction $\exp(x)$ 'l'emporte' sur les fonctions puissances.

La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$

$$y = f'(0)(x) + f(0) = 0x + 0 = 0$$



Développements limités avec Python.

Avec le langage Python, on obtient le développement limité ci-dessous :

Rappels : `**` est la notation de la puissance. `O(x**6)` est une notation qui remplace la limite.

```
In [5]: from sympy import *
x=Symbol('x')
expr=log(1-x**2)
series(expr,x,0,8)
```

Out[5]: $-x^{**2} - x^{**4}/2 - x^{**6}/3 + O(x^{**8})$

- 1) De quelle fonction s'agit-il ? A quel ordre ? Au voisinage de quel point ?
- 2) Ecrire correctement le DL à l'ordre 3.
- 3) Quelle est l'équation de la tangente en 0 ?
- 4) Donner la position de la courbe par rapport à la tangente.

Calculer la limite d'une fraction rationnelle.

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{-x^2 + 4}$$

Solutions :

- 1) Il s'agit de la fonction $f(x) = \ln(1 - x^2)$ au voisinage de 0 à l'ordre 8.
- 2) $f(x) = \ln(1 - x^2) = -x^2 + x^3\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \epsilon(x) = 0$.
- 3) $y = 0$ est l'équation de la tangente à la courbe en 0.
- 4) La position de la courbe par rapport à la tangente en 0 dépend du signe de $-x^2$.
 $-x^2 < 0$ La courbe est donc au dessous de sa tangente en 0

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{-x^2 + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2) = -2$$

Asymptote horizontale en $-\infty$ d'équation $y = -2$

Tester une primitive.

Soit les fonctions définies par :

$$F(x) = e^{-x}(-2x - 4) - \frac{1}{2}x \quad \text{et} \quad f(x) = e^{-x}(2x + 2) - \frac{1}{2}$$

Vérifier que F est une primitive de f.

Solutions.

$$F'(x) = -e^{-x}(-2x - 4) + e^{-x}(-2) - \frac{1}{2} = e^{-x}(-(-2x - 4) - 2) - 0,5 = e^{-x}(2x + 2) - 0,5 = f(x)$$

Résoudre une équation avec la fonction exponentielle.

Résoudre l'équation :

$$e^{x^2+x} = 1$$

Calculer la limite de fonctions.

Calculer les limites suivantes et indiquer si les courbes ont des asymptotes.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x + 1}{x^2 + 3x + 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^2 + 3x + 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3x - 4}{x + 2}$$

Solutions :

$$e^{x^2+x} = 1 \Leftrightarrow x^2 + x = \ln(1) = 0$$

Solutions : $S = \{-1; 0\}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x + 1}{x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{x} = 0$$

La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^2 + 3x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3x - 4}{x + 2}$$

x	-2
$x + 2$	- 0 +

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{3x - 4}{x + 2} = -\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow -2^+} 3x - 4 = -10$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} x + 2 = 0^+$

Simplification avec des puissances.

• Simplifier $\frac{4^6 \times 4^{-2}}{4^{-3}}$ $\frac{4^2 \times 2^3}{2^{-3}}$

Formules utiles : $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Logarithmes Népériens, simplifications de formules.

Formules utiles : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

$\ln(a^n) = n \ln(a)$ $\ln(1) = 0$ $\ln(e) = 1$

$$\sqrt{a} = a^{0,5}$$

Démontrer que $\ln(3x - 4) + 2 \ln(x) = \ln(x^2(3x - 4))$

$$\ln(4\sqrt{x}) = 2 \ln(2) + \frac{\ln(x)}{2}$$

Solutions :

$$\frac{4^2 \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^{2^2} \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^4 \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^7}{2^{-3}} = 2^{10}$$

$$\frac{4^6 \times 4^{-2}}{4^{-3}} = \frac{4^4}{4^{-3}} = 4^7$$

$$\ln(3x - 4) + 2 \ln(x) = \ln(3x - 4) + \ln(x^2) = \ln((3x - 4)x^2)$$

$$\ln(4\sqrt{x}) = \ln(4) + \ln(\sqrt{x}) = \ln(2^2) + \ln(x^{0,5}) = 2 \ln(2) + 0,5 \ln(x) = 2 \ln(2) + \frac{\ln(x)}{2}$$

Probabilité et tableaux.

	Badminton	Volley	Course	Total
Filles	60	100		300
Garçons				
Total	200		300	800

On prend un élève au hasard, calculer :

$$P(\text{badminton}) \quad P(\text{Fille}) \quad P(\text{Course})$$

Sachant que l'élève pris au hasard soit un garçon, calculer : $P_{\text{Garçon}}(\text{volley})$

Calculer la probabilité de faire du badminton et d'être une fille.

Solutions :

	Badminton	Volley	Course	Total
Filles	60	100	140	300
Garçons	140	200	160	500
Total	200	300	300	800

$$P(\text{badminton}) = \frac{200}{800} = \frac{1}{4} \quad P(\text{Fille}) = \frac{3}{8} \quad P(\text{Course}) = \frac{3}{8}$$

Sachant que l'élève pris au hasard soit un garçon, calculer :

$$P_{\text{Garçon}}(\text{volley}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\text{badminton} \cap \text{fille}) = \frac{60}{800} = \frac{3}{40}$$


Résoudre une inéquation en utilisant la fonction exponentielle.

Résoudre

$$2 \times 0,1^x > 0,5$$

Calculer des probabilités avec un arbre.

On étudie la réussite au bac des élèves redoublants :




Calculer la probabilité d'être redoublant $P(\text{RED})$.

Solutions :

$$2 \times 0,1^x > 0,5 \Leftrightarrow 0,1^x > 0,25$$


$$\Leftrightarrow x \ln(0,1) > \ln(0,25) \quad (\text{car } \ln \text{ croissante}) \Leftrightarrow x < \frac{\ln(0,25)}{\ln(0,1)} \quad (\text{car } \ln(0,1) < 0)$$



D'après le théorème des probabilités totales

$$P(RED) = 0,85 \times 0,04 + 0,15 \times 0,02 = 0,037$$

Probabilités, écritures.



Sans calculer, donner les probabilités suivantes :

$$P_{BAC}(RED) \quad P_{\overline{BAC}}(\overline{RED}) \quad P(BAC)$$

Calculer $P(\overline{RED} \cap BAC)$. Calculer la probabilité de ne pas être redoublant. Calculer $P(RED)$

Calculer $P_{RED}(BAC)$ Cours : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Probabilités conditionnelles.

Cours : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

- On donne $P(A) = 0,3$ $P(B) = 0,2$ et $P(A \cup B) = 0,3$

Calculer $P_A(B)$

Solutions :

$$P(RED)_{BAC} = 0,04 \quad P(\overline{RED})_{\overline{BAC}} = 0,98 \quad P(BAC) = 0,85$$

$$P(\overline{RED} \cap BAC) = 0,85 \times 0,96 = 0,816$$

Calculer la probabilité de ne pas être redoublant.

$$P(\overline{RED}) = 0,85 \times 0,96 + 0,15 \times 0,98 = 0,963$$

$$P_{RED}(BAC) = \frac{P(BAC \cap RED)}{P(RED)} = \frac{0,04 \times 0,85}{1 - 0,963} = 0,919$$

On a $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,2$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}$$

Dériver une fonction inverse.

Dériver la fonction suivante : $f(x) = \frac{4}{-2x+1}$

Résoudre une inéquation en utilisant la fonction exponentielle.

Résoudre

$$2 \times 0,1^x > 0,5$$

$$2 \times 0,1^x > 0,5 \Leftrightarrow 0,1^x > 0,25$$

$$\Leftrightarrow x \ln(0,1) > \ln(0,25) \quad (\text{car } \ln \text{ croissante}) \Leftrightarrow x < \frac{\ln(0,25)}{\ln(0,1)} \quad (\text{car } \ln(0,1) < 0)$$

Solutions.

$$f'(x) = \frac{0 \times (-2x+1) - 4(-2)}{(-2x+1)^2} = \frac{8}{(-2x+1)^2} \quad \text{On peut aussi utiliser la formule : } \left(\frac{1}{U}\right)' = \frac{-U'}{U^2}$$

Etudier une série statistiques à une variable.

- Donner les indicateurs de la série :

4	6	8	10	11	13	14	14	16	20
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Calculer les indicateurs et réaliser une « boîte à moustaches »

Calculer une dérivée.

Soit la fonction définie par $f(x) = xe^{-2x}$. Calculer la dérivée de la fonction f . Donner une factorisation de votre résultat.

Solutions.

$$f'(x) = e^{-2x} + x(-2e^{-2x}) = e^{-2x}(1 - 2x) \text{ Forme } (uv).$$

Il y a 10 valeurs (effectif = 10)

La médiane est entre le 5^{ème} et le 6^{ème}. Soit la moyenne entre 11 et 13. **Médiane = 12.**


Premier quartile ($10 \times \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = 2,5$)

On prend donc la troisième valeur pour Q_1 . **$Q_1=8$.**

Troisième quartile ($10 \times \frac{3}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$). On prend donc la huitième valeur pour Q_3 . **$Q_3=14$.**

Vous pouvez réaliser une « boîte à moustaches » avec les valeurs :

4 ; 8 ; 12 ; 14 et 20.



Vacances de Noël

Simplification avec des puissances.

- Simplifier $\frac{4^6 \times 4^{-2}}{4^{-3}}$ $\frac{4^2 \times 2^3}{2^{-3}}$

Formules utiles : $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Logarithmes Népériens, simplifications de formules.

Formules utiles : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$

$\ln(a^n) = n \ln(a)$ $\ln(1) = 0$ $\ln(e) = 1$

$$\sqrt{a} = a^{0,5}$$

Démontrer que $\ln(3x - 4) + 2 \ln(x) = \ln(x^2(3x - 4))$

$$\ln(4\sqrt{x}) = 2 \ln(2) + \frac{\ln(x)}{2}$$

Solutions :

$$\frac{4^6 \times 4^{-2}}{4^{-3}} = \frac{4^4}{4^{-3}} = 4^7$$

$$\frac{4^2 \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^{2^2} \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^4 \times 2^3}{2^{-3}} = \frac{2^7}{2^{-3}} = 2^{10}$$

$$\frac{4^6 \times 4^{-2}}{4^{-3}} = \frac{4^4}{4^{-3}} = 4^7$$

$$\ln(3x - 4) + 2 \ln(x) = \ln(3x - 4) + \ln(x^2) = \ln((3x - 4)x^2)$$

$$\ln(4\sqrt{x}) = \ln(4) + \ln(\sqrt{x}) = \ln(2^2) + \ln(x^{0,5}) = 2 \ln(2) + 0,5 \ln(x) = 2 \ln(2) + \frac{\ln(x)}{2}$$

Résoudre les équations suivantes :

$$\ln(3x + 1) = 4 \text{ pour } x \in]-\frac{1}{3}; +\infty[$$

$$e^{2x+1} = 3 \text{ pour } x \in \mathbb{R}$$

Dériver une fonction.

Dériver la fonction $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$

Solutions.

$$\ln(3x + 1) = 4 \Leftrightarrow 3x + 1 = e^4 \Leftrightarrow 3x = e^4 - 1 \Leftrightarrow x = \frac{e^4 - 1}{3} \approx 17,9 \text{ pour } x \in]-\frac{1}{3}; +\infty[$$

$$S = \left\{ \frac{e^4 - 1}{3} \right\}$$

$$e^{2x+1} = 3 \Leftrightarrow 2x + 1 = \ln(3) \Leftrightarrow x = \frac{\ln(3) - 1}{2} \approx 0,05 \text{ pour } x \in \mathbb{R}$$

$$S = \left\{ \frac{\ln(3) - 1}{2} \right\}$$

$$f'(x) = (UV)' = U'V + UV' = 2e^{-x} + (2x + 1)(-e^{-x}) = e^{-x}(2 - (2x + 1)) = e^{-x}(2 - 2x - 1) = e^{-x}(-2x + 1)$$

Retour de stage

Résoudre une équation.

Résoudre l'équation suivante :

$$6e^{-3t} + 1 = 8$$

Calculer une dérivée.

Soit la fonction définie par $f(x) = xe^{-x^2}$. Calculer la dérivée de la fonction f . Donner une factorisation de votre résultat.

Solutions :

$$6e^{-3t} + 1 = 8 \Leftrightarrow 6e^{-3t} = 7 \Leftrightarrow e^{-3t} = \frac{7}{6} \Leftrightarrow -3t = \ln\left(\frac{7}{6}\right) \Leftrightarrow$$

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{7}{6}\right)}{3} \approx -0,05$$

$$f'(x) = e^{-x^2} + x(-2xe^{-x^2}) = e^{-x^2}(1 - 2x^2) \text{ Forme } (uv).$$

Ajustement affine.

Le tableau suivant donne l'évolution des bénéfices d'une société.

Années (Le 1 correspond à 2011)	1	2	3	4	5	6
Bénéfices en milliers d'euros	48	49	52,5	55	56	61

On cherche à savoir s'il existe une corrélation entre les années et les bénéfices de la société. Donner le point moyen.

Trouver une équation de la droite d'ajustement affine des bénéfices par rapport aux années par la méthode des moindres carrés. Donner le coefficient de corrélation. Qu'en pensez-vous ?

Evaluer le bénéfice pour l'année 2019.


Solutions (python)

```

: def demo2() :
    liste_x=[1,2,3,4,5,6]
    liste_y=[48,49,52.5,55,56,61]
    Representation(liste_x,liste_y)
    AffichageElements(liste_x,liste_y)
    x=9
    print(f"La valeur pour {x} est {EvalY(liste_x,liste_y,x):.2f}")

demo2()

```



Ecriture $y=ax+b$
 $a= 2.528571428571429$
 $b= 44.733333333333334$
 coefficient de corrélation : 0.9812408373608256
 La valeur pour 9 est 67.49

Résoudre une inéquation avec logarithme.

Résoudre l'inéquation suivante :

$$2,5 \times 0,85^n \leq 1,25$$

Solutions :

$$2,5 * 0,85^n \leq 1,25 \Leftrightarrow 0,85^n \leq \frac{1,25}{2,5} \Leftrightarrow 0,85^n \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \ln(0,85) \leq \ln\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln(0,85)} \geq 4,26$$

Calculer une intégrale avec la calculatrice.

En utilisant la calculatrice, calculer l'intégrale

$$\int_0^6 (x + 3) dx$$

A quoi correspond cette intégrale ?


Calculer une intégrale.

Calculer $\int_0^3 e^{3x} dx$

Solutions :

$$\int_0^6 (x+3)dx = 36$$

Cette intégrale correspond à l'aire de la partie située entre la courbe représentative de $f(x) = x + 3$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=0$ et $x=6$



$$\int_0^3 e^{3x} dx = \left[\frac{e^{3x}}{3} \right]_0^3 = \frac{e^9}{3} - \frac{e^0}{3} = \frac{e^9 - 1}{3}$$

Primitive et intégrale

On considère la fonction définie par $f(x) = x e^{-x}$ sur \mathbb{R}

1. Soit la fonction définie par $G(x) = e^{-x}(-x - 1)$. Montrer que G est une primitive de f.
2. Calculer $\int_0^1 f(x)dx$. Interpréter géométriquement cette aire.


Solutions.

$$G'(x) = -e^{-x}(-x - 1) + e^{-x}(-1) = e^{-x}(-(-x + 1) - 1) = x e^{-x} = f(x)$$

$$G(x) = e^{-x}(-x - 1)$$

$$\int_0^1 f(x)dx = |e^{-x}(-x - 1)|_0^1 = e^{-1}(-1 - 1) - e^{-0}(-0 - 1) = -2e^{-1} + 1$$

Ce nombre (environ 0,26) correspond à l'aire de la partie située entre la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.



Chercher une primitive.

Donner une primitive de $f(x) = e^{-x+2}$

Chercher une primitive.

Donner une primitive de la fonction $f(x) = 3e^{-2x}$

$$F(x) = -\frac{3}{2}e^{-2x}$$

Solutions.

$$F(x) = -e^{-x+2}$$

Intégration par parties.

Le cours

$$\int_a^b f(x)dx = |F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{avec } F'(x) = f(x) \text{ } F \text{ est une primitive de } f$$

Avec U et V deux fonctions dérivables sur un intervalle I et a et b deux réels de I .

$$\int_a^b U' \times V dx = |U \times V|_a^b - \int_a^b U \times V' dx$$

Calculer $\int_{-1}^1 x \times e^x dx$

Solutions

On pose $U'=e^x$ et $V = x$.

On obtient $U = e^x$ et $V'=1$

On a donc

$$\int_{-1}^1 x \times e^x dx = |x \times e^x|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 e^x dx = 1 \times e^1 - (-1) \times e^{-1} - |e^x|_{-1}^1 =$$

$$e^1 + e^{-1} - (e^1 - e^{-1}) = e^1 - e^1 + e^{-1} + e^{-1} = 2e^{-1}$$

```

> (%i1) integrate(x*exp(x), x, -1, 1);
-
(%o1) 2 %e-1

```

Intégration par parties.

Le cours

$$\int_a^b f(x)dx = |F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{avec } F'(x) = f(x) \text{ } F \text{ est une primitive de } f$$

Avec U et V deux fonctions dérivables sur un intervalle I et a et b deux réels de I .

$$\int_a^b U' \times V dx = |U \times V|_a^b - \int_a^b U \times V' dx$$

Calculer $\int_1^e \ln(x^2) dx$

Vérifier une primitive.

Vérifier que la fonction $F(x) = (-2 - x)e^{-x}$ définie sur \mathbb{R} est une primitive de la fonction

$$f(x) = e^{-x} + xe^{-x}$$

Solutions

On pose $U=1$ et $V=\ln(x^2)$.

On obtient $U= x$ et $V'=\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$

On a donc

$$\int_1^e \ln(x^2)dx = |x \ln(x^2)|_1^e - \int_1^e \frac{2x}{x} dx = e \ln(e^2) - 1 \ln(1) - \int_1^e 2 dx = 2e \ln(e) - |2x|_1^e = 2e - (2e - 2) = 2$$


$$\begin{aligned} F'(x) &= -e^{-x} + (-2 - x)(-e^{-x}) = e^{-x}(-1 - (-2 - x)) = e^{-x}(-1 + 2 + x) = e^{-x}(1 + x) \\ &= e^{-x} + xe^{-x} = f(x) \end{aligned}$$

Vacances de printemps

Algorithme de dichotomie.

Interpréter les résultats de la console PYTHON.

```
2
3 def dichotomie(a,b,amplitude,f):
4     """On cherche la solution de f(x)=0 sur l'intervalle [a,b] pour l'amplitude demar
5         Cette fonction renvoie deux valeurs encadrants la solution"""
6     assert(a<b) # on teste a<b
7     assert(f(a)*f(b)<0) # on teste f(a) et f(b) de signes contraires
8     while abs(b-a)>amplitude : # abs(x) est la valeur absolue de x
9         centre=(a+b)/2
10        if f(centre)*f(b)<0: # f(centre) et f(b) sont de signes contraires
11            a=centre
12        else :
13            b=centre
14
15    return a,b
16
17 def g(x):
18     return (x**2-x-1)
19
20
```



Le logarithme décimal, intensité sonore

Le niveau sonore (en décibels) d'un son d'intensité I (en $W.m^{-2}$) est donné par la formule $l = 10 \text{ LOG } \frac{I}{I_0}$. On donne $I_0 = 10^{-12} W.m^{-2}$. Le seuil de danger est de 90 dB. Quelle est l'intensité correspondante ? Donner la valeur exacte.

Rappel : La fonction réciproque de $\log(x)$ est 10^x

Solutions :

La console renvoie l'encadrement de l'antécédent x_0 de 0 par la fonction $f(x) = x^2 - x - 1$ avec une amplitude de 0,01 sur $[1,2]$.

On peut écrire $1,61 \leq x_0 \leq 1,62$

$$I = 10 \text{ LOG } \frac{l}{l_0} \Leftrightarrow 90 = 10 \text{ LOG } \frac{l}{10^{-12}} \Leftrightarrow 9 = \text{ LOG } \frac{l}{10^{-12}} \Leftrightarrow 10^9 = \frac{l}{10^{-12}} \Leftrightarrow$$

$$l = 10^{-12} \cdot 10^9 = 10^{-3}$$

Calculer une intégrale.

Calculer $\int_0^3 e^{-2x} dx$. Penser à vérifier à la calculatrice.

Dériver une fonction.

- Dériver la fonction $f(x) = \frac{e^{2x}}{x^2}$

Solutions :

$$\int_0^3 e^{-2x} dx = \left| \frac{e^{-2x}}{-2} \right|_0^3 = \left(-\frac{e^{-6}}{2} - \left(-\frac{e^0}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} - \frac{e^{-6}}{2}$$
$$\approx 0,5$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 e^{2x} - 2xe^{2x}}{x^4} = \frac{2xe^{2x}(x-1)}{x^4} = \frac{2e^{2x}(x-1)}{x^3}$$

Arbre de probabilité et probabilités totales.

- La proportion de droitiers est de 0,85. Les droitiers sont créatifs selon une proportion de 0,4. Les gauchers sont créatifs selon une proportion de 0,7. On considère les événements « être droitier » et « être créatif » sont indépendants.

Faire un arbre et trouver la probabilité d'être droitier sachant que la personne est créative.


Cours : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Calculer une intégrale.

Calculer $\int_0^3 x + e^x dx$. Penser à vérifier à la calculatrice.

Solutions :

D= droitiers, G=gauchers, C=créatifs.



$$P_C(D) = \frac{0,85 \times 0,4}{0,85 \times 0,4 + 0,15 \times 0,7} = 0,76$$

$$\int_0^3 x + e^x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 + e^x \right]_0^3 = \left(\frac{9}{2} + e^3 - e^0 \right) = \frac{7}{2} + e^3 \approx 23,6$$

Probabilité conditionnelle.

Cours : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Les évènements A et B sont indépendants ssi $P_A(B) = P(B)$ ou $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Les évènements A et B sont incompatibles ssi $P(A \cap B) = 0$

On donne $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$ et on sait que les évènements A et B sont indépendants.

Calculer $P_A(B)$, $P_B(A)$ $P(A \cap B)$ $P(A \cup B)$

Tester une primitive. Trouver un encadrement à la calculatrice.

Soit les fonctions définies par :

$$F(x) = e^{-x}(-2x - 4) - \frac{1}{2}x \quad \text{et} \quad f(x) = e^{-x}(2x + 2) - \frac{1}{2}$$

$$f(t) = e^{at} ; \quad f'(t) = a e^{at}$$

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(ku)' = k u'$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

- 1) Vérifier que F est une primitive de f.
- 2) Donner un encadrement à 0,001 près de $f(x) = 0$
- 3) Calculer $\int_0^3 f(x) dx$

Solutions :

Les évènements A et B sont indépendants.

$$P_A(B) = P(B) = 0,5 \quad P_B(A) = P(A) = 0,3 \quad P(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15 \quad P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$$

Solutions :

- $F'(x) = -e^{-x}(-2x - 4) + e^{-x}(-2) - \frac{1}{2} = e^{-x}(-(-2x - 4) - 2) - 0,5 = e^{-x}(2x + 2) - 0,5 = f(x)$
- $2,692 < \alpha < 2,693$. On entre la fonction f dans la calculatrice et on « joue » sur les paramètres de la table de valeurs.
- $\int_0^3 f(x)dx = \left[e^{-x}(-2x - 4) - \frac{1}{2}x \right]_0^3 = e^{-3}(-6 - 4) - \frac{3}{2} - (e^{-0}(-4)) = -10e^{-3} - \frac{3}{2} + 4 = -10e^{-3} + \frac{5}{2}$

Algorithme de seuil.

Une balle part d'une hauteur de 2,5 m et perd 15% de sa hauteur à chaque rebond. On cherche le nombre de rebonds pour qu'elle perde la moitié de sa hauteur. Pour résoudre le problème, on considère l'algorithme suivant :

Lire h
 $0 \rightarrow n$
 Tant que $h > 1,25$
 $n + 1 \rightarrow n$
 $h * 0,85 \rightarrow h$

Fin tant que
Afficher n

Remplir le tableau d'exécution suivant :

	Initialisation					
n	0					
h	2,5					

Calculer une valeur moyenne d'une fonction.

Rappel : la valeur moyenne d'une fonction est donnée par la formule :

$$\text{Moyenne} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Calculer la valeur moyenne de la fonction $f(x) = 3e^{-x}$ sur l'intervalle [0 ;4].

Solutions :

	Initialisation					
n	0	1	2	3	4	5
h	2,5	2,125	1,81	1,54	1,31	1,11

L'algorithme affiche 5

$$\text{Moyenne} = \frac{1}{4} \int_0^4 3e^{-x} dx = \frac{1}{4} [-3e^{-x}]_0^4 = -\frac{3}{4}(e^{-4} - 1) = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}e^{-4}$$

Etude d'une loi associée à une variable aléatoire.

Rappels : $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i \times x_i$ et $V(X) = \sum_{i=1}^n p_i \times x_i^2 - (E(X))^2$ et $\delta(X) = \sqrt{V(X)}$

On considère la variable aléatoire X et la loi de probabilité associée :

$X = x_i$	0	1	2	3	4	5
$p_i = P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,15	0,15	

- Compléter la loi de probabilité.
- Calculer :

$$P(1 \leq X \leq 3) \quad P(X < 2) \quad P(X \geq 3) \quad P(0 < X < 4) \quad P(X < 1) \quad P(4 \leq X)$$

3) Calculer l'espérance, et l'écart-type.

Calculer une intégrale.

Calculer $\int_0^3 e^{3x} dx$. Donner une interprétation géométrique de cette intégrale.

Solutions :

$X = x_i$	0	1	2	3	4	5
$p_i = P(X = x_{i_i})$	0,2	0,1	0,2	0,15	0,15	0,2

$$P(1 \leq X \leq 3) = 0,45 \quad P(X < 2) = P(X \leq 1) = 0,3 \quad P(X \geq 3) = 0,5$$

$$P(0 < X < 4) = P(1 \leq X \leq 3) = 0,45 \quad P(X < 1) = P(X = 0) = 0,2 \quad P(4 < X) = P(X = 5) = 0,2$$

$$E(X) = 2,55$$


$$\delta(X) = 1,77$$

$$\int_0^3 e^{3x} dx = \left[\frac{e^{3x}}{3} \right]_0^3 = \frac{e^9}{3} - \frac{e^0}{3} = \frac{e^9 - 1}{3}$$

Ce nombre correspond à l'aire de la partie située entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 3$

Calculer une intégrale.

Soit les fonctions f et g définie par $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$



Un logiciel a trouvé l'aire entre les deux courbes représentatives des deux fonctions. Comment retrouver cette aire par le calcul ? Démontrer que la valeur exacte de cette aire est

$$e^2 + e^{-2} - 2$$

Solutions.

Cette aire est calculée par l'intégrale : $I = \int_0^2 e^x - e^{-x} dx$.

$$I = \int_0^2 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^2 = e^2 + e^{-2} - (e^0 + e^{-0})$$

$$I = e^2 + e^{-2} - (1 + 1) = e^2 + e^{-2} - 2$$

Calculer avec une loi binomiale.

Soit X , la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p $X \rightarrow B(n; p)$

$E(X) = n.p$ (Espérance qui correspond à la moyenne) $V(X) = n.p.(1 - p)$ (Variance)

$$\delta(X) = \sqrt{V(X)} \text{ (Ecart - type)}$$

Calculs à la calculatrice :

$P(X = k)$ Casio, stat, dist, BINM Bpd TI, distrib, BinomFdp

$P(X \leq k)$ Casio, stat, dist, BINM Bcd TI, distrib, BinomFrep

Soit X , la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,3$. $X \rightarrow B(100; 0,3)$

Calculer $P(X = 25)$ et $P(X \leq 30)$

Intégrale.

Calculer $\int_1^5 4 dx$ (Penser à vérifier à la calculatrice)

Solutions.

$X \rightarrow B(100; 0,3)$

$P(X = 25) = 0,05$

$P(X \leq 30) = 0,55$

$$\int_1^5 4 dx = [4x]_1^5 = 4 \times 5 - 4 \times 1 = 16$$

Loi binomiale, rédaction.

Une société produit des composants électroniques. Une étude statistique montre que 2% des produits sont défectueux. Cette société prélève un lot de 70 composants dans son stock pour effectuer des tests. On suppose le stock suffisamment important pour considérer le tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de composants électroniques défectueux.

Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Calculer la probabilité d'avoir 2 composants défectueux.

Calculer la probabilité d'avoir au plus 5 composants défectueux.

Calculer la probabilité d'avoir au minimum un composant défectueux.

Solutions.

L'épreuve élémentaire : 'prélever un composant dans le stock' n'a que deux issues possibles :

- Le composant est défectueux : $p = 0,02$
- Le composant n'est pas défectueux : $q = 1 - p = 0,98$

On répète de manière identique et indépendante 70 fois ce prélèvement car il est considéré comme un tirage avec remise.

La variable aléatoire X qui compte le nombre de composants défectueux suit alors une loi binomiale de paramètres $n=70$ et $p = 0,02$

$$X \rightarrow B(70 ; 0,02)$$

$$P(X = 2) = 0,245$$

$$P(X \leq 5) = 0,997$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 0,757$$

Calculer avec une loi binomiale.

$X \rightarrow B(n ; p)$ $E(X) = n.p$ (Espérance qui correspond à la moyenne) $V(X) = n.p.(1 - p)$ (Variance)
 $\delta(X) = \sqrt{V(X)}$ (Ecart - type)

Calculs à la calculatrice :

$P(X = k)$ Casio, stat,dist,BINM Bpd TI,distrib,BinomFdp

$P(X \leq k)$ Casio, stat,dist,BINM Bcd TI,distrib,BinomFrep

Soit X , la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n = 200$ et $p = 0,45$.

$$X \rightarrow B(200 ; 0,45)$$

Calculer $P(X = 80)$, $P(X \leq 85)$ $P(X > 90)$ $E(X)$ $V(X)$ $\sigma(X)$

Intégrale.

Calculer $\int_0^5 2e^{-2x} dx$ (Penser à vérifier à la calculatrice)

Solutions.

$$X \rightarrow B(200 ; 0,45)$$

$$P(X = 80) = 0,02 , \quad P(X \leq 85) = 0,26 \quad P(X > 90) = 0,47 \quad E(X) = 90 \quad V(X)=49,5 \quad \sigma(X) = 7$$

$$\int_0^5 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_0^5 = -e^{-10} - (-e^0) = -e^{-10} + 1 = 1 - e^{-10}$$

Intervalle de fluctuation asymptotique a seuil de 95%.

Un candidat A affirme que 53% des personnes votent pour lui. Le candidat B organise un rapide sondage sur 200 personnes et récoltent 90 réponses pour le candidat A.

On a comme information technique que l'intervalle de fluctuation d'une variable aléatoire X qui suit une loi binomiale de paramètres 200 et 0,53

$$X \rightarrow B(200 ; 0,53) \text{ est } I_{0,95} = \left[\frac{92}{200}; \frac{120}{200} \right] = [0,46; 0,60]$$

Vérifier que vous trouvez bien le bon intervalle de fluctuation. Qu'en pensez-vous ?

Solutions :

$\frac{90}{200} = 0,45$. Or $0,45 \notin [0,46; 0,60]$. On peut dire que le candidat A n'a pas raison avec une marge d'erreur de 5%.

Comparaison loi binomiale et loi de Poisson.

Les variables X et Y suivent respectivement une loi binomiale et une loi de Poisson

Soit $X \rightarrow B(100 ; 0,03)$ et $Y \rightarrow P(\lambda)$ Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \leq 4)$

Pour approcher la binomiale par la loi de Poisson on utilise $\lambda = n.p$

Calculer λ . Calculer $P(Y = 2)$ et $P(Y \leq 4)$ et comparer avec la variable aléatoire X

Intervalle de fluctuation au seuil de 95%

Donner l'intervalle de fluctuation de la variable X qui suit une loi binomiale telle que $X \rightarrow B(35 ; 0,04)$

D'après la notice, une machine produit 4% de pièces défectueuses. Je prélève 35 pièces sur la chaîne de production et je trouve 3 pièces défectueuses. Que pensez-vous du réglage de la machine ?

Solutions :

$X \rightarrow B(100 ; 0,03)$ et $Y \rightarrow P(\lambda)$

$$P(X = 2) = 0,225$$

$$P(X \leq 4) = 0,818$$

Pour approcher la binomiale par la loi de Poisson on utilise $\lambda = n.p$

$\lambda = 3$. $P(Y = 2) = 0,224$ et $P(Y \leq 4) = 0,815$. Les valeurs sont très proches car $n > 30$ et $p < 0,1$

$X \rightarrow B(35 ; 0,04)$

Intervalle de fluctuation au seuil de 95% associée à X (fréquence des succès)

$$I_{0,95} = \left[\frac{0}{35}; \frac{4}{35} \right] = [0; 0,11]$$

On calcule la fréquence des pièces défectueuses de notre échantillon : $\frac{3}{35}$

On a $\frac{3}{35} = 0,09$ et $0,09 \in [0; 0,11]$. On peut affirmer au seuil de 95% que la machine est réglée correctement.

Intégrale.

Calculer $\int_1^{10} 4e^{-4x} dx$ (Penser à vérifier à la calculatrice)

Intégrale.

Calculer $\int_0^6 \frac{1}{5} dx$ (Penser à vérifier à la calculatrice)

Solutions.

$$\int_1^{10} 4e^{-4x} dx = [-e^{-4x}]_1^{10} = -e^{-40} - (-e^{-4}) = e^{-4} - e^{-40}$$

$$\int_0^6 \frac{1}{5} dx = \left[\frac{1}{5} x \right]_0^6 = \frac{1}{5} 6 - \frac{1}{5} 0 = \frac{6}{5}$$

Loi binomiale.

La variable X suit une loi binomiale telle que : $X \rightarrow B(100 ; 0,03)$

Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \leq 4)$

En utilisant $\lambda = n.p$ calculer les deux valeurs précédentes en utilisant une loi de Poisson de paramètre λ .

Solutions :

$$X \rightarrow B(100 ; 0,03) \quad P(X = 2) = 0,225 \quad P(X \leq 4) = 0,818$$

$\lambda = n.p = 100 \times 0,03 = 3$. On utilise une variable aléatoire Y qui suit une loi de Poisson de paramètre 3.

$$P(Y = 2) = 0,224 \quad P(Y \leq 4) = 0,815$$

Loi uniforme

Z suit une loi uniforme dans l'intervalle $[15 ; 45]$

Calculer $P(15 \leq Z \leq 25)$ $P(Z > 20)$ $P(Z \leq 20)$ $P(Z = 25)$

Donner $E(Z)$, $V(Z)$ et $\sigma(Z)$

Z suit une loi uniforme dans l'intervalle [15 ;45] $P(15 \leq Z \leq 25) = \frac{25-15}{45-15} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ $P(Z > 20) = \frac{45-20}{45-15} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$

$$P(Z \leq 20) = \frac{20-15}{45-15} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6} \quad P(Z = 25) = 0$$

$$E(Z) = 30, \quad V(X) = \frac{900}{12} = \frac{150}{2} = 75 \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{150}{2}} = 8,66$$

Calculer avec une loi exponentielle.

X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,001$.

Sur $[0; +\infty[$ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ Redémontrez cette formule

Démontrer que $P(X \leq b) = 1 - e^{-\lambda b}$ et $P(a \leq X) = e^{-\lambda a}$

Calculer $P(X < 4)$ $P(2 \leq X \leq 6)$ et $P(X > 5)$ $P(X = 4)$

Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$

Solutions.

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_a^b = -e^{-\lambda b} - (-e^{-\lambda a}) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$P(X \leq b) = P(0 \leq X \leq b) = 1 - e^{-\lambda b}$$

$$P(a \leq X) = 1 - P(X \leq a) = 1 - (1 - e^{-\lambda a}) = e^{-\lambda a}$$

$$P(X < 4) = P(0 < X < 4) = 1 - e^{-0,004} \approx 0,004$$

$$P(2 \leq X \leq 6) = e^{-0,002} - e^{-0,006} \approx 0,004$$

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - (1 - e^{-0,005}) \approx 0,995$$

$$P(X = 4) = 0$$

$$E(X) = 1000, \quad V(X) = 1000000, \quad \sigma(X) = 1000$$

Calculer le paramètre de la loi exponentielle.

Soit X la variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ . **Rappels :**

$$P(a \leq x \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} \quad P(X \leq b) = P(0 \leq X \leq b) = 1 - e^{-\lambda b} \quad P(a \leq X) = e^{-\lambda a}$$

On donne $P(2 \leq X) = 0,6$ Calculer λ

Calculer avec une loi normale.

Soit X la variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 14,5$ et d'écart type $\delta = 2$

Calculer $P(12,5 \leq X \leq 16,5)$ $P(X \leq 14,5)$ $P(15 \leq X)$ $P(15 = X)$ $P(X \leq k) = 0,8$ (Utiliser la touche fracnormal ou Invnormal)

Solutions :

$$P(12,5 \leq X \leq 16,5) = 0,68$$

$$P(X \leq 14,5) = P(-10^{99} \leq X \leq 14,5) = 0,5$$

$$P(15 \leq X) = P(15 \leq X \leq 10^{99}) = 0,4$$

$$P(15 = X) = 0$$

$$P(X \leq k) = 0,8 \Leftrightarrow k = 16,18 \text{ (fracnormal ou Invnormal)}$$

$$P(2 \leq X) = 0,6 \text{ Or } P(a \leq X) = e^{-\lambda a} \text{ donc } P(2 \leq X) = e^{-2\lambda} = 0,6$$

$$e^{-2\lambda} = 0,6 \Leftrightarrow -2\lambda = \ln(0,6) \Leftrightarrow \lambda = \frac{\ln(0,6)}{-2} = \frac{-\ln(0,6)}{2} = 0,255$$

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Soit X la variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n=50$ et $p=0,35$

Peut-on approcher X par une loi normale ? Donner ses paramètres, on appellera Y .

$$\text{Calculer } P(14 \leq X \leq 20) \quad P(X = 24)$$

$$P(14 \leq Y \leq 20) \quad P(Y = 24)$$

Trouver une méthode pour approcher $P(Y = 24)$

Solutions :

$$P(14 \leq X \leq 20) = P(X \leq 20) - P(X \leq 13) = 0,70$$

$$P(X = 24) = 0,02$$

$$\text{On a } n = 50 \geq 30 \quad np = 17,5 \geq 5 \quad \text{et } n(1 - p) = 32,5 \geq 5$$

Y suit une loi normale de paramètres $\mu = np = 17,5$ et $\sigma = \sqrt{np(1 - p)} = 3,37$

$$P(14 \leq Y \leq 20) = 0,62$$

$$P(Y = 24) = 0$$

En utilisant la **correction de continuité**, on peut dire que $P(Y = 24) = P(23,5 \leq Y \leq 24,5) = 0,02$